

*Vertebratorum novorum vel minus cognitorum oræ Africæ
occidentalis incolarum.*

Diagnoses (4),

Auctore D^r A. T. DE ROCHEBRUNE
e Museo Parisiensi.

SERIES PRIMA

MAMMALIA.

1. CRICETOMYS DISSIMILIS.

C. — Corpus *C. Gambiensis* habitu, sed statura minore; dorso castaneo fusco, nigro permixto; lateribus sordide fulvis; marginibus labiorum superiorum, collo, ingluvie, abdomine, partibusque interioribus artuum, albo cinereis; brachiis et cruribus, antice fulvo auratis, lateraliter albo nitente marginatis; digitibus albis; rostro pilis brevissimis rufis, induto; vibrissis nigris; auribus intus lutescentibus, extus rufis, tenuiter pilosis; caudæ parte antica castanea, parte postica alba, spatio medio late castaneo maculato, undique setis albescentibus vestita.

Longitudo ab apice rostri, ad caudæ basin... 0,226.

— caudæ 0,385.

Hab. — Locum *Landana* dictum. — In Museo Bouvieri.

(1) Malgré l'opinion toute personnelle de M. F. Z. S. Olfield Thomas qui, dans le *Zoological Record* (1882. *Mammalia*, p 13), se plaint de ce que nous donnons dans le *Bulletin de la Société Philomatique de Paris*: « MOST INSUFFICIENT DESCRIPTIONS, » nous continuerons à agir comme par le passé, en priant le Savant Anglais de recourir pour plus de détails: au supplément à notre Faune de la Sénégambie (*en voie de publication*); de comparer ses propres diagnoses aux nôtres, et de bien se pénétrer des différences que, nous autres Français, nous établissons entre ces deux mots: « DIAGNOSE et DESCRIPTION. »

Toutes les formes dont nous donnons les *diagnoses*, dans cette première série et dans celles qui lui feront suite, seront figurées en couleurs dans nos suppléments aux Vertébrés de la Sénégambie.

Tantum a *Cricetomyde Gambrinsi*, signis exterioribus, hanc formam dignoscitur, quantum habitu ossium.

2. MALACOMYS EDWARDSI.

M. — Corpus gracile ; dorso castaneo nitente ; utrinque splendide fusco aurato ; genis, scapulisque pallidioribus ; lateribus, ingluvie, et artuum latere interno albis ; gastræo schistaceo ; pedibus rufis ; vibrissis nigerrimis ; auriculis latis, ovatis, nudis, infuscatis ; cauda corpore longiore, nuda, nigro rufescente.

Longitudo ab apice rostri ad caudæ basin... 0,438.

— caudæ..... 0,454.

Hab. — Ad ripas amnis dicti *Mellacorée*. — In Museo Bouvieri.

Præclaro Professori A. Milne-Edwards, auctore generis *Malacomys*, hanc pulchram formam, libentissime dicamus.

A. M. longipede, ferrugineo que (A. M. Edw.) plane differt.

3. MUS TEPHRUS.

M. — Corpus *M. decumani*, habitu ; pilis mollissimis ; dorso subfusco ; lateribus pallide fusco cinereis ; genis, ingluvie, collo, abdomine, artuumque partibus interioribus, albo cinereis ; talaribus nigrescentibus ; pedibus glabris, luteis ; fronte rostroque rufis ; auribus latis, subnudis, flavidis, fascia lata cinereo fusca marginatis ; vibrissis tenuibus, longissimis, nigro alboque bipartitis ; cauda corpore brevior, usque ad tertiam partem nuda, squamosa, fusco lutea, deinde alba, setis brevissimis, resupinatis, oblecta.

Longitudo ab apice rostri ad caudæ basin... 0,250.

— caudæ..... 0,470.

Hab. — Locum *Landana* dictum. — In Museo Bouvieri.

4. LYNX LUCANI.

L. — Corpus *C. domestici* habitu ; supra fulvo castaneum ; dorso

fascia intense castanea a regione occipitali usque ad caudæ extremitatem gerente, antice posticeque lata, medio angustata; fronte pallide fulvo, nigro undulato; oculorum margine nigro; genis cinereo fulvis, minute castaneo tri vel quadrimaculatis; oris labrorum, ingluvie, albo cinereis, schistaceo guttatis; collo lateraliter et inferne rufo lutescente; regione parotica luteo rufa; lateribus fulvis nigro undulatis; abdomine cinereo fulvo, maculis castaneis sparso; scapulis femoribusque fulvis, rufo intense punctatis; ulnis et cruribus externe fulvis, maculis irregularibus nigris concentricè dispositis et in fasciis latis dilutioribus ad faciem internam albam desinentibus, ornatis; pedibus rufis, intus nigrescentibus; unguibus luteo albis; auriculis latis externe nigris, macula albo lutea, lata, ovoidea, centraliter disposita, ornatis, cinereo marginatis; intus pilis longissimis, altitudinem attingentibus, vestitis; cauda corpore brevior, superne rufa, inferne cinereo fusca, castaneo annulata.

Longitudo ab apice rostri ad caudæ basin... 0,472.

— caudæ..... 0,250.

Hab. — Locum *Landana* dictum, ad limites nemorum Rhizophorarum. — In Museo Bouvieri.

Ab omnibus congeneribus, plane differt.

AVES.

Duæ formæ singularis, sub nomine: *Cinnyride fuliginoso*, Viell., permixtæ sunt; ætas in ullo modo nec tempora anni, ut dicunt auctores, efficiuntur ordinationem colorum; tali modo, aves illas characteribus validis distinguere existimamus:

5. CINNYRIS FULIGINOSUS.

C. — *Typus*, ♂ *adult.* — Supra fulvo purpureo iridescente; collo postico et interscapulio, cupreo nitide flammatis; plaga ante oculari, minima, nigro nitente; fronte intense violaceo; guttore nigro violaceo nitidissimo; alis intense fulvo purpureis; tectricibus